

Condado de Camden

Hoja informativa sobre el cáncer

La Coalición contra el Cáncer del Condado de Camden debe su existencia a la subvención que otorga la Oficina para el Control y la Prevención del Cáncer del Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de Nueva Jersey. La misión de la Coalición contra el Cáncer del Condado de Camden es poner en práctica en este condado el Plan de Control Integral del Cáncer de Nueva Jersey. Si desea más información sobre el Control Integral del Cáncer en Nueva Jersey, visite: www.njcancer.gov. Si desea más información sobre la Coalición contra el Cáncer del Condado de Camden, visite: www.camdencancercoalition.org.

Perfil demográfico del condado 2000 versus 2006

	2000 ¹	2006 ²
Población	508,932	517,001
Mediana de la edad*	36	37
Composición racial:		
Blancos (%)	71	68
Negros (%)	18	19
Asiáticos (%)	4	5
Composición étnica:		
Hispanos (%)	10	12
Mediana de los ingresos por familia*	\$48,097	\$56,913
% de residentes \geq 25 años de edad que no terminaron los estudios secundarios	20	17
% de residentes que viven por debajo del nivel de pobreza*	8	11

Fuentes: Oficina Estadounidense de Censos; ¹ Censo del 2000, y ² Encuesta Comunitaria Estadounidense del 2006

* Los datos correspondientes a los años 2000 y 2006 deben compararse con cautela dado que se utilizaron métodos diferentes para la recopilación de datos.

Peso general del cáncer

Entre 2000 y 2004, en el Condado de Camden se diagnosticó cáncer a un promedio de 634 hombres y 470 mujeres de cada 100,000 por año. Esta cifra es comparable a la tasa de Nueva Jersey, de 614 hombres y 447 mujeres. La tasa promedio anual de mortalidad por cáncer en el Condado de Camden fue de 261 para los hombres y de 191 para las mujeres, mientras que la tasa estatal fue de 237 y 172, respectivamente. Al igual que en el estado, los tipos de cáncer que afectan a la mayoría de las personas en el Condado de Camden son los cánceres de próstata, de mama, de pulmón y colorrectal.

Nota: Las tasas son cada 100,000 y están ajustadas por edad a los estándares de población del Censo Estadounidense del 2000.

Temas centrales

- **Acceso y recursos:** Muchos residentes manifiestan que su problema más importante es la falta de atención médica acorde a sus presupuestos. El 13% de los residentes del Condado de Camden carece de seguro médico. El acceso a la salud es una prioridad tanto para el Plan 2007 para Mejorar la Salud de la Comunidad en el Condado de Camden (Camden County Community Health Improvement Plan, CHIP) como para la Evaluación de las Necesidades Sanitarias de la Comunidad de la Ciudad de Camden (por terminarse), mientras que mejorar el transporte es uno de sus objetivos.
- **Educación escolar sobre la salud:** Muchas escuelas no enseñan a los estudiantes a hacerse el autoexamen de mamas y testículos, como lo recomiendan los estándares de los programas de estudio. Hacen falta más programas como el Youth Quit2win para ayudar a los jóvenes a dejar de fumar.
- **Nutrición y actividad física:** El mensaje educativo que se necesita difundir debe apuntar a que los residentes tomen conciencia de que la buena nutrición y la actividad física reducen el riesgo de enfermarse de cáncer. Es necesario que todos los municipios adhieran formalmente a la Iniciativa de los Alcaldes para el Bienestar del 2007.
- **Fortalecimiento de las relaciones de colaboración:** El cargo remunerado de Coordinador de la Coalición, de tiempo parcial, ha facilitado el establecimiento de redes y es necesario mantenerlo.
- **Investigación:** La última evaluación sobre las necesidades de salud dirigida a los proveedores de atención médica primaria a nivel condado/región se realizó en 1993, hace 14 años. Los eventos educativos profesionales dirigidos a proveedores de la atención médica continúan siendo una necesidad para lograr que el CCCP de NJ pueda concretarse a nivel de la práctica médica primaria, lo cual constituye un punto de entrada CLAVE para las personas en nuestro sistema de salud.

Condado de Camden y Nueva Jersey

Tasa de incidencia anual promedio ajustada por la edad y tasa de mortalidad por sitio 1996-2000 versus 2000-2004

Todos los tipos de cáncer	Tasa de incidencia cada 100,000*				Tasa de mortalidad cada 100,000**			
	Condado de Camden			NJ	Condado de Camden			NJ
	1996-2000 ¹	2000-2004 ²	Variación (%)	2000-2004 ²	1996-2000 ³	2000-2004 ²	Variación (%)	2000-2004 ²
Hombres	626.8	634.4	1.2	614.4	281.8	260.6	-7.5	236.8
Mujeres	447.9	460.9	2.9	447.0	194.9	190.8	-2.1	171.9
Cánceres prioritarios según el CCCP de NJ, por sexo								
De mama, mujeres	128.0	128.1	0.1	131.9	34.6	30.3	-12.4	28.5
De cuello uterino, mujeres	10.5	11.5	9.5	9.6	2.3	2.5	8.7	2.7
Colorrectal, hombres	81.1	74.0	-8.8	70.2	30.5	28.3	-7.2	25.9
Colorrectal, mujeres	59.9	54.4	-9.2	50.8	19.7	20.6	4.6	18.3
De pulmón, hombres	107.0	96.0	-10.3	82.4	87.5	79.1	-9.6	66.5
De pulmón, mujeres	60.1	66.3	10.3	55.4	47.5	52.2	9.9	40.7
Melanoma, hombres	14.1	24.8	75.9	24.4	5.5	3.8	-30.9	3.9
Melanoma, mujeres	8.1	12.1	49.4	15.0	1.5	1.5	0.0	1.7
Oral/orofaríngeo, hombres	17.3	15.6	-9.8	14.6	4.5	4.4	-2.2	3.8
Oral/orofaríngeo, mujeres	5.4	5.9	9.3	6.0	1.2	1.9	58.3	1.4
De próstata, hombres	172.0	178.9	4.0	192.7	33.6	27.6	-17.9	27.0

Fuentes:

- ¹ Registro del Cáncer del Estado de Nueva Jersey, Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de Nueva Jersey, Agosto de 2003.
- ² Registro del Cáncer del Estado de Nueva Jersey, Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de Nueva Jersey. *Tasas de cáncer. Info/NJ.* <http://www.nj.gov/health/ces/cancer-rates.shtml> (Noviembre de 2007).
- ³ Instituto Nacional del Cáncer y Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, State Cancer Profiles (Perfil del cáncer por estado) (En <http://statecancerprofiles.cancer.gov/>).

Notas:

Las tasas están ajustadas por edad a los estándares de población del Censo Estadounidense del 2000.

Las tasas que superan en al menos un 10% la tasa estatal correspondiente se muestran en letra **negrita cursiva**.

Las tasas anuales para cánceres relativamente no comunes tienden a fluctuar notablemente de un año a otro debido al pequeño número de casos. El % de variación para los cánceres cuyas tasas de incidencia y/o mortalidad son bajas debe interpretarse con cautela.

* Cantidad de nuevos casos diagnosticados en una población determinada durante un tiempo determinado cada 100,000 personas.

** Cantidad de muertes a causa de una enfermedad en una población determinada durante un tiempo determinado cada 100,000 personas.



Para obtener más información:

New Jersey Department of Health & Senior Services
Office of Cancer Control and Prevention
P.O. Box 360
Trenton, NJ 08611-2425
(609) 984-4978
www.njcancer.gov

