

Побочные эффекты вакцинации от COVID-19: чего ожидать



Каждый человек, начиная с возраста шести месяцев, должен получить хотя бы одну дозу вакцины COVID-19 за (2024–2025).

Прививку от COVID-19 можно делать одновременно с другими прививками, в том числе и от гриппа.

У вакцин есть побочные эффекты, которые различны у каждого человека. Они проявляются через пару дней после прививки, но обычно проходят в легкой форме. Ниже указаны распространенные* побочные эффекты.



- Боль, отек и покраснение руки или ноги в месте инъекции.
- Усталость.
- Сонливость, раздражительность/плаксивость и снижение аппетита. **
- Жар/озноб.
- Головная боль.
- Боль в мышцах и суставах.
- Тошнота/рвота.
- Отек лимфатических узлов.

* Побочные эффекты чаще проявляются после дополнительных доз у детей от 4 до 17 лет.

** Более распространены у детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.



- Если покраснение или боль в месте инъекции усиливаются через 24 часа или если побочные эффекты не проходят через несколько дней, обратитесь к доктору.
- **Тяжелые реакции, например затрудненное дыхание, возникают редко. Наберите 911, если вам кажется, что у ребенка возникла тяжелая аллергическая реакция.**

Подробную информацию см. на cdc.gov/covid/vaccines/getting-your-covid-19-vaccine.html

Найти бесплатные вакцины и адреса пунктов вакцинации можно, посетив сайт nj.gov/health/vaccines/covid-19 или отсканировав QR-код. Также можно посетить vaccines.gov.

