



فحص سمع حديثي الولادة

**New Jersey Early Hearing
Detection and Intervention**

(إدارة اكتشاف إعاقات السمع والتدخل
بنيجيرسي)



الرجاء استخدام رمز الاستجابة السريع
للاطلاع على هذا الدليل باللغات التالية:

English
Español
한국어
Türkçe

Polski
العربية
Português
kreyòl ayisyen

français
বাংলা
हिन्दी



**New Jersey Early Hearing
Detection and Intervention**
(إدارة اكتشاف إعاقات السمع وعلاجها بنيجيرسي)

nj.gov/health/fhs/nbs/ehdi

البريد الإلكتروني: Ehdi@doh.nj.gov
هاتف رقم: 609-292-5676
فاكس رقم: 609-633-7820



C36750

مُسببات فقدان السمع الشائعة لدى الأطفال الرُضّع

إن المسببات كافة غير معروفة، ولكن إليكم بعضها:

عوامل جينية تُسبب حوالي 50% من حالات فقدان السمع الخلقي.

البقاء في الرعاية المركزة لحديثي الولادة (NICU) لأكثر من خمسة أيام لأسباب مثل الابتسار ونقص الأكسجين عند الميلاد.

قد تؤدي العدوى في أثناء الحمل مثل الحمى (الفيروسية) المضخمة للخلايا (CMV) إلى إتلاف الأذن الداخلية النامية. الرجاء التفضل بزيارة nationalcmv.org لمزيد من المعلومات.

أدوية بما فيها المضادات الحيوية ومدرات البول قد تكون سامة للأذن الداخلية.

وفي حال أي استفسار حيال سمع
طفلك، الرجاء مخاطبة مقدم خدمات
الرعاية الصحية.



Early Hearing Detection and Intervention (EHDI) (السمع والتدخل)

إن EHDI عبارة عن مبادرة صحة عامة وطنية تدغم '1-3-6' الإرشادات:

فحص كل حديث ولادة لاكتشاف فقدان السمع قبل مرور شهر **واحد** من الولادة
الرجاء إتمام التقييم السمعي التشخيصي قبل مرور **ثلاثة** أشهر من الولادة للرضع الذين لا يجتازون فحص سمعهم
الرجاء تسجيل الأطفال المُشخصة إصابتهم بفقدان السمع لدى "خدمات التدخل المبكر" قبل مرور **ستة** أشهر من الولادة

يُولد 90% من الأطفال الذين يعانون من فقدان السمع لأبوين يسمعان.

ما السبب في فحص سمع الطفل؟

يستوجب قانون نيو جيرسي إجراء فحص السمع للمواليد كافة.
يمكن لغالبية الأطفال السماع جيدًا عند الولادة، ولكن بعضهم لا يسمعون.
الأطفال الذين لم يُكتشف فقدانهم للسمع مبكرًا سيعانون في أثناء التعلم.
إن فحص السمع سريع وآمن ولا يؤلم.
حين تتلقى نتائج فحص سمع الطفل، ستتلقى توصيات بالمتابعة إن لزم الأمر.

بعض الأمور التي ينبغي أن يتمكن الأطفال ذوي السمع الطبيعي من القيام بها:

من الميلاد حتى 3 أشهر:

الطرفات أو القفزات متى وقع صوت مرتفع مفاجئ
وحين الحديث إليه، يهذه أو يبتسم
يُخرج أصواتًا مثل "أوه" أو "آه"

من 3 حتى 6 أشهر:

توجيه النظر تجاه الأصوات
الشروع في المناغاة (بابا، ماما، جاجا)
استخدام العديد من الأصوات والصنيل والضحك الخافت

من 6 حتى 9 أشهر:

توجيه الرأس نحو الأصوات المرتفعة
فهم "لالا" أو "باي باي"
المناغاة (بابا، ماما، جاجا)

من 9 حتى 12 أشهر:

تكرار الكلمات والأصوات البسيطة التي تصدر عنك
استخدام "ماما" أو "دادا" استخدامًا صحيحًا
الاستجابة إلى الغناء أو الموسيقى
الإشارة إلى الألعاب والأشياء حين السؤال عنها

يبدأ الأطفال في تعلم الكلام واللغة خلال شهورهم الحياتية الأولى. يطور الأطفال الذين يعانون فقدان السمع الذين يحصلون على مساعدة مبكرة مهارات لغوية أفضل ويتعلمون التواصل بنجاح.

لماذا يحتاج طفلي إلى فحص سمع آخر؟

في حال لم يجتز الطفل فحص السمع، قد تُراودك عدة تساؤلات. قد يحتاج بعض الأطفال إلى فحص آخر جزاء:
وجود سوائيل في الأذن
وجود ضوضاء في غرفة الفحص
فرط حركة الطفل
معاناة الطفل من فقدان السمع

في حال عدم اجتياز الطفل لأحد فحوصات السمع، الرجاء التأكد من فحصه مرة أخرى في أقرب فرصة ممكنة. يتمتع غالبية الأطفال الذين يحتاجون إلى إجراء فحص سمع آخر بسمع طبيعي، في حين يعاني البعض فقدانًا في السمع.

ما أهمية إجراء فحص سمع آخر في أقرب فرصة ممكنة؟

إن الفحص هو السبيل الوحيد لمعرفة إن كان الطفل يعاني فقدانًا في السمع أم لا. وكلما كان اكتشاف فقدان السمع باكراً، كان ذلك أفضل للطفل. وفي حال معاناة الطفل من فقدان السمع، يمكننا مد يد العون عبر سبيل عدة.

