

## Niektóre z zachowań, które powinno przejawiać dziecko z normalnym słuchem:

### W wieku od urodzenia do 3 miesięcy

- Mruganie lub podskakiwanie, jeżeli usłyszy nagły, głośny dźwięk
- Uspokajanie się lub uśmiechanie, kiedy się do niego mówi
- Wydawanie takich dźwięków jak "oo" lub "aa"

### W wieku od 3 do 6 miesięcy

- Szukanie wzrokiem dźwięków
- Gaworzenie ("baba", "mama", "gaga")
- Używanie wielu dźwięków, pieszczanie, chichotanie

### W wieku od 6 do 9 miesięcy

- Odwracanie głowy w kierunku głośnych dźwięków
- Rozumienie "nie, nie" lub "pa, pa"
- Gaworzenie, na przykład "baba", "mama", "gaga"

### W wieku od 9 do 12 miesięcy

- Powtarzanie prostych słów i dźwięków przez siebie wydawanych
- Poprawne używanie "mama" lub "tata"
- Reagowanie na śpiewanie lub muzykę
- Wskazywanie na ulubione zabawki lub obiekty, jeżeli jest o nie pytane

Jeżeli masz pytania dotyczące słuchu twojego dziecka lub powyższej listy, porozmawiaj ze swoim przedstawicielem służby zdrowia.

## Gdzie jeszcze mogę zdobyć informacje?

New Jersey Department of Health  
Early Hearing Detection and Intervention Program  
PO Box 364 • Trenton, NJ 08625-0364  
(609) 984-1343 (tel. dla g?uchoniemych)  
(609) 292-5676 (tylko g?osowy)  
ehdi@doh.nj.gov  
[www.nj.gov/health/fhs/ehdi/](http://www.nj.gov/health/fhs/ehdi/)  
[www.hearinghelp4kids.nj.gov](http://www.hearinghelp4kids.nj.gov)

# Czy twoje dziecko słyszy?

## Pierwsze badanie słuchu twojego dziecka

(Can Your Baby Hear? - Polish)



Philip D. Murphy, Governor  
Sheila Y. Oliver, Lt. Governor

Judith M. Persichilli, RN, BSN, MA  
Commissioner

## Dlaczego słuch mojego dziecka powinien być zbadany?

- Większość dzieci dobrze słyszy po urodzeniu, niektóre jednak nie.
- Badamy dzieci, by znaleźć te, które mogą mieć kłopoty ze słuchem.
- Badanie jest jedynym sposobem by stwierdzić, czy dziecko ma wadę słuchu.
- Ważne jest, by wykryć utratę słuchu jak najszybciej. Dzieci, których utrata słuchu nie jest wcześniej wykryta, będą miały kłopoty z nauką.
- Jeżeli wykryjemy wcześniej utratę słuchu, będziemy mogli pomóc twojemu dziecku na wiele sposobów.

*Upewnij się, że badanie słuchu twojego dziecka jest przeprowadzone przed twoim wyjściem ze szpitala.*

## Co powinnam wiedzieć o badaniu słuchu?

- Badanie jest bezpieczne i bezbolesne, oraz może być przeprowadzone w ciągu 10 minut.
- Większość dzieci śpi w trakcie badania.
- Otrzymasz wyniki badania przed swoim wyjściem ze szpitala.
- Nie zapomnij podać w szpitalu nazwisko swojego lekarza lub nazwę swojej przychodni, by szpital mógł przesłać im wyniki badania.



## Dlaczego niektóre dzieci potrzebują dodatkowego badania słuchu?

- Niektóre dzieci mogą potrzebować dodatkowego badania ze względu na:
  - *płyn w uchu*
  - *hałas w pokoju, w którym prowadzono badanie*
  - *dużą ruchliwość dziecka w czasie badania*
  - *utratę słuchu przez dziecko*
- Większość dzieci wymagających dodatkowego badania ma słuch w normie. Niektóre z nich mają utratę słuchu.
- Jeżeli badanie słuchu twojego dziecka da wynik negatywny, dopilnuj, by zostało ono jak najszybciej ponownie przebadane.

## Czy nowo urodzone dziecko może pozytywnie przejść badania słuchu, a jednak mieć utratę słuchu?

- Tak, niektóre dzieci słyszą na tyle dobrze, by pozytywnie przejść pierwsze badanie, później jednak tracą słuch z powodu:
  - *pewnych chorób*
  - *pewnych leków*
  - *pewnych obrażeń*
  - *rodzinnych skłonności do utraty słuchu*
- Bądź wyczulona na znaki utraty słuchu w miarę tego jak rośnie twoje dziecko.
- Korzystaj z listy podanej na tylnej okładce jako przewodnika.