제대로 알기:
원숭이두창 및 성 건강

원숭이두창은 바이러스에 의한 감염병입니다. 증상은 경미할 수 있지만 일부 사례는 더 심각하여 입원해야 할 수 있습니다. 다음은 이 감염병의 확산을 예방하고 안전을 지키기 위해 알아야 할 사항입니다.

원숭이두창의 증상은 무엇입니까?

다음과 같은 증상이 있습니다.

- **발진, 부종, 수포가** 생식기 주변 또는 다른 부위(손, 발, 얼굴, 가슴 등)에 발생합니다. 흔한 성 감염병 또는 대상포진이나 옻나무 피부염 같은 피부 발진과 비슷해 보일 수 있습니다.
- **독감 유사 증상**, 예를 들어 발열, 두통 및 전신통, 림프절 부종 및 오한이 발진이 생기기 전에 발생할 수 있습니다.

원숭이두창은 어떻게 전염됩니까?

원숭이두창은 **사람들 간에 신체적 밀접 접촉에 의해** 전파됩니다:

- 원숭이두창 발진에 직접 접촉.
- 장시간 대면 접촉에 의한 호흡기 비말 또는 구강 타액과 접촉.
- 원숭이두창 감염자가 사용한, 수건, 침구, 의류 등의 물건이나 천 접촉.

보기기!

원숭이두창 증상이 있거나 감염이 의심될 경우 어떻게 해야 합니까?

원숭이두창 증상이 있으면, **의료 제공자**, 긴급 진료 센터 또는 병원으로 즉시 **연락하십시오**. 감염자를 다른 사람들로부터 격리할 준비를 할 수 있도록 방문 전에 먼저 전화를 하십시오. 반드시 마스크를 착용하십시오. 최근에 여행을 갔다왔거나, 유사한 발진이 있는 람이나 원숭이두창 진단을 받은 사람과 접촉을 했다면 의료 제공자에게 알리십시오.

원숭이두창은 어떻게 예방할 수 있습니까?

- 성관계 파트너에게 발진이나 기타 원숭이두창 증상이 있는지 **물어보십시오**.
- 발진이나 기타 원숭이두창 증상이 있는 사람과 직접적인 피부 접촉을 **피하십시오**.
- 증상이 있거나 바이러스에 노출되었다면 담당 의료진에게 **문의하십시오**.
- 감염자가 사용한 침구, 의류 또는 그 밖의 물건과 접촉을 **피하십시오**.
- 감염자를 감염 위험이 있는 사람과 **격리하십시오**.
- 감염자와 접촉한 후 비누와 물로 손을 잘 **씻으십시오**. 또는 알코올 성분의 손 소독제를 사용하십시오.

백신이 있습니까?

원숭이두창 바이러스에 대한 백신으로 **JYNNEOS**가 있습니다. 백신 접종이 원숭이두창 전염을 예방하기 위해 중요하지만, 백신을 맞은 사람들도 원숭이두창에 걸린 사람과의 친밀한 접촉 등 밀접 피부 접촉을 피하여 지속적으로 스스로를 보호해야 합니다.

자세한 정보는
bit.ly/njmpx
사이트를 방문하시거나 QR 코드를 스캔하여 주십시오.

스캔하세요