

원숭이두창 바로 알기



- 원숭이두창 바이러스는 종종 독감과 유사한 초기 증상을 동반하며 발진이나 수포(수두)와 같은 병세를 유발할 수 있습니다.
- 원숭이두창은 보통 개인간 피부 밀접 접촉으로 누구에게나 전염될 수 있습니다.



증상

- 원숭이두창의 초기 독감과 유사한 증상으로는 발열, 두통, 근육통, 요통, 림프절 부종, 오한 및 피로감이 포함됩니다.
- 발진은 고열이 발생하고 1-3일(더 길 수 있음) 이내에 나타나며 주로 얼굴부터 시작하여 신체의 다른 부위로 퍼져가는 경향이 있습니다.
- 증상은 보통 2-4주간 지속됩니다.



감염 경로

- 원숭이두창 감염 경로:
 - 원숭이두창 발진, 수포 또는 피부 딱지와 직접 접촉
 - 원숭이두창 감염자가 사용한 물건, 의류, 침구, 수건 또는 표면 접촉
 - 원숭이두창 감염자의 호흡기 비말 또는 구강 타액과 접촉
- 원숭이두창은 증상이 시작되는 시점부터 모든 병변이 치유될 때까지 전파될 수 있으며 몇 주가 걸릴 수도 있습니다. 일부 사람들은 증상이 나타나기 전 1-4 일 동안 다른 사람에게 원숭이두창을 전염시킬 수 있습니다.



최근 원숭이두창 발생 지역

- 미국을 포함하여 보통은 원숭이두창이 발생하지 않는 몇 개 국가에서 최근에 원숭이두창 사례가 보고되었습니다.
- 원숭이두창은 주로 원숭이두창 환자와 밀접하게 직접 접촉하여 확산됩니다.



치료법 및 예방

- 원숭이두창만을 위한 치료법은 없습니다. 원숭이두창과 천연두를 유발하는 바이러스가 유사하기 때문에 천연두를 예방하기 위해 개발된 항생제를 원숭이두창을 효과적으로 치료하는 데 사용할 수 있습니다.
- 원숭이두창 예방을 위해 선호되는 백신은 JYNNEOS입니다. 기타 정보는: nj.gov/health/monkeypox/vaccines에서 확인해 주십시오.



일반인을 위한 권고 사항

- 일반인들의 위험은 낮습니다.
- 원숭이두창이 염려되면 즉시 치료를 받으십시오.
- 피부 병변이나 생식기 병변이 있는 사람을 포함하여 몸이 아픈 사람과의 밀접 접촉을 피하십시오.



자세한 정보

- 치료 관련 질문은 담당 의료진에게 문의하세요.
- 웹사이트 방문: nj.gov/health/monkeypox